



**WP LAB**  
Indústria Farmacêutica  
— DESDE 1933 —

# Alerginyl®

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **ALERGINYL®**

Insumos ativos: Croton tiglium, Graphites, Rhus toxicodendron, Sulphur

### Medicamento Homeopático

### APRESENTAÇÕES

Apresentação comercial:

Frasco de vidro âmbar contendo 20 mL, com gotejador atóxico + seringa dosadora

Forma farmacêutica: Solução oral

Via de administração: **ORAL**

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:

Croton tiglium.....6CH.....álc. 30%(v/v).....0,25 mL  
Graphites.....6CH.....álc. 30%(v/v).....0,25 mL  
Rhus toxicodendron.....6CH.....álc. 30%(v/v).....0,25 mL  
Sulphur.....6CH.....álc. 30%(v/v).....0,25 mL

Veículo: álcool de cereais

Gradação alcoólica final: 30%

33 gotas equivalem a, aproximadamente, 1 mL do medicamento

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**ALERGINYL®** é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas de processos alérgicos que envolvem coriza, espirros, obstrução nasal, afecções nos olhos como inflamação e inchaço nas pálpebras, irritação cutânea, eczema, urticária e prurido.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

**ALERGINYL®** tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas de processos alérgicos, que envolvem coriza, espirros, obstrução nasal, afecções nos olhos como inflamação e inchaço nas pálpebras, irritação cutânea, eczema, urticária e prurido.

**Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do ALERGINYL®:**

**Croton tiglium:** Age no combate das afecções nos olhos como: inchaço edematoso e vesículas nas pálpebras, erupções em torno dos olhos, coriza, espirros, irritação e inflamação cutânea, eczema por todo corpo, prurido na pele.

**Graphites:** Atua como auxiliar no tratamento das pálpebras vermelhas e inchadas, eczema das pálpebras, o bordo das pálpebras está fissurado com películas e crostas, eczemas e erupções atrás das orelhas, espirros, afecções da pele e eczema exsudativos.

**Rhus toxicodendron:** Atua como auxiliar no tratamento da inflamação e inchaço das pálpebras, olhos vermelhos e inchados,

coriza, espirros, nariz inchado, irritação cutânea, eczema, urticária e prurido.

**Sulphur:** Atua como auxiliar no tratamento da coceira e queimação nos olhos, pálpebras inchadas e vermelhas, coriza com espirros, espirros frequentes, inflamação e inchaço no nariz e nas afecções da pele como: coceira por todo corpo, erupção pruriginosa, escoriações especialmente nas dobras, eczema, e na urticária.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos saudáveis.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C” de risco de gravidez).**

O que significa risco de gravidez “categoria C”? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

**Este medicamento é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

Até o momento, são desconhecidas outras contra-indicações do medicamento **ALERGINYL®**.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite gotejar sob a língua, por produzir ardência causada pela presença de álcool.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

**Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 30%.**

**ALERGINYL® possui, em sua formulação, insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo:**

**Incompatibilidade Rhus toxicodendron: Apis mellifica.**

**Inimigos Sulphur: Lycopodium clavatum.**

**Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento ALERGINYL®.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: líquido, incolor e com odor alcoólico.**

**Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

#### CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS

**Nas crises alérgicas:** Tomar 1 gota em 5 mL de água de 15 em 15 minutos, espaçando o horário para intervalos de 30 em 30 minutos, de hora em hora, de duas em duas horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

**Nos casos crônicos:** Tomar 1 gota em 5 mL de água de 12 em 12 horas, ou conforme orientação médica.

**Como preventivo:** Tomar 1 gota em 5 mL de água pela manhã, pelo período de 3 meses, ou conforme orientação médica.

**AO DILUIR A DOSE A SER ADMINISTRADA EM ÁGUA CONFORME POSOLOGIA SUGERIDA NESTA BULA, A GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DO MEDICAMENTO É REDUZIDA A ZERO, O QUE PERMITE O USO SEGURO PARA A FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA.**

#### **CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS**

**Nas crises alérgicas:** Tomar 5 gotas em 5 mL de água de 15 em 15 minutos, espaçando o horário para intervalos de 30 em 30 minutos, de hora em hora, de duas em duas horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

**Nos casos crônicos:** Tomar 5 gotas em 5 mL de água de 12 em 12 horas, ou conforme orientação médica.

**Como preventivo:** Tomar 5 gotas em 5 mL de água pela manhã, pelo período de 3 meses, ou conforme orientação médica.

#### **ADULTOS**

**Nas crises alérgicas:** Tomar 10 gotas em 5 mL de água de 15 em 15 minutos, espaçando o horário para intervalos de 30 em 30 minutos, de hora em hora, de duas em duas horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

**Nos casos crônicos:** Tomar 10 gotas em 5 mL de água de 12 em 12 horas, ou conforme orientação médica.

**Como preventivo:** Tomar 10 gotas em 5 mL de água pela manhã, pelo período de 3 meses, ou conforme orientação médica.

Faixa Etária	Quantidade de água para diluição	Quantidade do medicamento
Crianças até 2 anos	5 mL	1 gota
Crianças acima de 2 anos	5 mL	5 gotas
Adultos	5 mL	10 gotas

#### **Instruções para o uso do medicamento nos pacientes pediátricos**

<b>Etapa 1:</b> Utilizando a seringa dosadora, medir a quantidade de água indicada na posologia de acordo com a idade do paciente.	
<b>Etapa 2:</b> Dispensar a água medida na seringa dosadora em um recipiente (exemplo: xícara de café).	
<b>Etapa 3:</b> Adicionar ao recipiente a quantidade de gotas do medicamento indicada na posologia de acordo com a idade do paciente e aguardar de 1 a 2 minutos para evaporação do álcool.	
<b>Etapa 4:</b> Em seguida preencher a seringa dosadora com o medicamento já diluído em água e distribuir lentamente na boca do paciente, entre a bochecha e a gengiva. Não dispensar mais rápido do que o paciente é capaz de engolir confortavelmente.	
<b>Etapa 5:</b> Após a administração, lave a seringa com água e guarde-a na respectiva caixa para que possa ser utilizada novamente.	

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Nos casos crônicos, não desaparecendo os sintomas em até 30 (trinta) dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre**

**este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

**Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento ALERGINYL®.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: sac@wplab.ind.br.**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

**Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.**

**Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.**

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018.

Farmacêutica Responsável: Dr.<sup>a</sup> Giselle da Costa Mateus CRF - PR 16959

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

#### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:**

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

#### **VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**



**WPLAB**  
Indústria Farmacêutica

— DESDE 1933 —



RECICLÁVEL

V05-BP