

BLOQDOR®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **BLOQDOR®**

Insumos ativos: Chionantbus virginica, Iris versicolor, Sanguinaria canadensis

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 40 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Chionanthus virginica.....5CH..... 8,33 µL

Iris versicolor.....5CH..... 8,33 µL

Sanguinaria canadensis.....5CH..... 8,33 µL

Excipientes q.s.p.....250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

BLOQDOR® é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas de enxaquecas e cefaleias.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

BLOQDOR® tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas de enxaquecas e cefaleias.

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do BLOQDOR®:

Chionanthus virginica: Atua como auxiliar no tratamento das enxaquecas e cefaleias frontais, dores nos olhos e nas têmporas.

Iris versicolor: Atua como auxiliar no tratamento de dores de cabeça acompanhada de náuseas.

Sanguinaria canadensis: Atua como auxiliar no tratamento das cefaleias e enxaquecas periódicas.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Até o momento são desconhecidas outras contraindicações do medicamento **BLOQDOR®**.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria "C" de risco na gravidez).

O que significa risco na gravidez "categoria C"? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Este medicamento contém LACTOSE.

Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento BLOQDOR®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de BLOQDOR® são brancos, circulares, sem odor (inodoros) e com a gravação WP em uma das faces do comprimido.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

ADULTOS:

Nos casos agudos de cefaleias e enxaquecas previamente diagnosticadas: Tomar ou dissolver na boca, 1 comprimido de 30 em 30 minutos, espaçando o horário para intervalos de hora em hora, duas horas em duas horas, três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Nos casos crônicos de cefaleias e enxaquecas previamente diagnosticadas: Tomar ou dissolver na boca, 1 comprimido por dia, pelo período mínimo de 6 meses, ou conforme orientação médica.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 2 dias para casos agudos e 6 meses para casos crônicos, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento são desconhecidas reações adversas do medicamento BLOQDOR®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: sac@wplab.ind.br.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº721, de 1º de julho de 2022.

Farmacêutica Responsável: Dr.^a Camila Cristine de Souza Kuritza CRF-PR 28603.

Homeopatia Waldemiro Pereira Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

REFERÊNCIAS

BOERICKE, W. – **Homeopatic Materia Medica**, 9ª edição, Nova Delhi.1982.

SIEFFERT, G. – **Formulaire de Thérapeutique Positive Homeopathe** – Paris, 1899.

ALLEN, H.C., **Sintomas chaves da Matéria Médica**, São Paulo, Dynamis, 1996.

TYLER, M.L. – **Retratos de Medicamentos Homeopáticos (vol. I e II)** – São Paulo: Santosed., 1999.

BOERICKE, W. – **Manual de Matéria Médica Homeopática Tomo II** – São Paulo: Robe Editorial, 2003.

VIJNOVSKY, B. – **Tratado de Matéria Médica (vol I, II e III)** – São Paulo: Ed. Organon,2003.