



WP LAB

Indústria Farmacêutica

— DESDE 1933 —

FreeSint TPM®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **FREESINT TPM®**

Insumos ativos: Calcarea carbonica, Cimicifuga racemosa, Matricaria chamomilla, Natrum muriaticum, Pulsatilla

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Calcarea carbonica.....	6CH.....	0,005 mL
Cimicifuga racemosa.....	6CH.....	0,005 mL
Matricaria chamomilla.....	6CH.....	0,005 mL
Natrum muriaticum.....	5CH.....	0,005 mL
Pulsatilla.....	6CH.....	0,005 mL
Excipientes q.s.p.....		250 mg
Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício)		

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

FREESINT TPM® é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados à Tensão Pré-Menstrual (TPM).

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

FREESINT TPM® tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas relacionados à Tensão Pré-Menstrual (TPM).

A Tensão Pré-Menstrual é uma condição caracterizada por manifestações físicas, emocionais e comportamentais que

precedem a menstruação, ocasionando o aparecimento de sintomas como ansiedade, tristeza, humor variável, irritabilidade, choro fácil, seios doloridos e inchados, inchaço abdominal, cólica menstrual, dor na região lombar e dor de cabeça.

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do FREESINT TPM®:

Calcarea carbonica: Atua como auxiliar no combate à leucorreia, calafrios, cefaleia, fadiga, seios doloridos e inchados antes da menstruação. Inquietude, ansiedade durante a menstruação, dor nas costas (região lombar) antes e durante a menstruação.

Cimicifuga racemosa: Atua como auxiliar no combate à irritabilidade, nervosismo, humor variável, inquietude, cólicas menstruais e dores de cabeça durante a menstruação, choro fácil, tristeza, dores na região ovariana antes da menstruação e dores na região lombar.

Matricaria chamomilla: Atua como auxiliar no tratamento da agitação, nervosismo, ansiedade, irritabilidade antes e durante a menstruação, sensibilidade, inchaço abdominal, cólica menstrual, dores lombares e nos quadris.

Natrum muriaticum: Atua como auxiliar no tratamento da constipação e cefaleia durante a menstruação e tristeza, choro fácil, ansiedade e irritabilidade antes da menstruação.

Pulsatilla: Atua como auxiliar no tratamento da ansiedade, irritabilidade, nervosismo, inquietude e agitação durante a menstruação, sensibilidade, mau humor, instabilidade emocional, choro fácil, tristeza, cefaleia (dor de cabeça), cólica menstrual e dores na região lombar antes e durante a menstruação e inchaço abdominal antes da menstruação.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos saudáveis.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C” de risco de gravidez).

O que significa risco de gravidez “categoria C”? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Até o momento, são desconhecidas outras contraindicações do medicamento **FREESINT TPM®**.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Este medicamento contém LACTOSE.

Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento FREESINT TPM®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento.

Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de **FREESINT TPM®** são brancos, circulares e sem odor (inodoros).

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

ADULTOS

Tomar (engolir) ou dissolver na boca (chupar), 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos à noite nos 15 dias que antecedem a menstruação, ou conforme orientação médica.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 15 dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento FREESINT TPM®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: sac@wplab.ind.br.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018.

Farmacêutica Responsável: Dr.^a Giselle da Costa Mateus
CRF - PR 16959

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.



WP LAB
Indústria Farmacêutica

— DESDE 1933 —

V00-BP