



WP LAB
Indústria Farmacêutica

— DESDE 1933 —

Leparin®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **LEPARIN®**

Insumos ativos: Bryonia alba, Eupatorium perfoliatum, Gelsemium sempervirens, Rhus toxicodendron

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 40 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

| | | |
|---|----------|------------|
| Bryonia alba | 4CH..... | 0,00625 mL |
| Eupatorium perfoliatum | 4CH..... | 0,00625 mL |
| Gelsemium sempervirens | 5CH..... | 0,00625 mL |
| Rhus toxicodendron | 6CH..... | 0,00625 mL |
| Excipientes q.s.p | | 250 mg |
| Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício) | | |

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

LEPARIN® é indicado como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

LEPARIN® tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas relacionados à gripe.

Os sintomas da gripe são caracterizados por febre, coriza, secreção

catarral, tosse, calafrios, dores de cabeça, fraqueza, sonolência, boca e garganta secas, nariz vermelho e dolorido, e rouquidão.

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do LEPARIN®:

Bryonia alba: Age no combate à cefaleia (dor de cabeça), dores nas extremidades, constrição da garganta, dispneia (respiração com dificuldade) e febre.

Eupatorium perfoliatum: Age no combate à cefaleia (dor de cabeça), dores nos membros e nas costas, febre, rouquidão, tosse seca e irritante, coriza e calafrios.

Gelsemium sempervirens: Age no combate à fraqueza, sonolência, calafrios, febre, cefaleia, coriza e sensação de corpo estranho na garganta com dificuldade de deglutição.

Rhus toxicodendron: Age no combate à dores articulares, lábios secos, boca e garganta secas, garganta inchada, cefaleia, nariz vermelho e dolorido, tosse seca e rouquidão.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para menores de 2 (dois) anos nesta forma farmacêutica.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C” de risco de gravidez).

O que significa risco de gravidez “categoria C”? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Até o momento, são desconhecidas outras contraindicações do medicamento **LEPARIN®**.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Este medicamento contém LACTOSE.

LEPARIN® possui, em sua formulação, insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo:

Incompatibilidade Rhus toxicodendron: Apis mellifica.

Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento **LEPARIN®**.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de LEPARIN® são brancos, circulares e sem odor (inodoros).

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

ADULTOS E CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS

Como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe: Tomar (engolir) ou dissolver na boca (chupar), 1 comprimido de hora em hora, espaçando o horário para intervalos de duas em duas horas, de três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Como preventivo: Tomar (engolir) ou dissolver na boca (chupar), 1 comprimido de 12 em 12 horas, pelo período de 6 meses (outono e inverno), ou conforme orientação médica.

Para crianças pequenas os comprimidos poderão ser administrados dissolvidos em água.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Quando utilizado como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe, não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento LEPARIN®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: sac@wplab.ind.br.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018.

Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus
CRF - PR 16959

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.



WP LAB
Indústria Farmacêutica

— DESDE 1933 —

V02-BP