WP LAB
Indústria Farmacêutica
DESDE 1933

Leparin®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **LEPARIN®**
Insumos ativos: Bryonia alba, Eupatorium perfoliatum, Gelsemium sempervirens, Rhus toxicodendron

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentação comercial:
Frasco de vidro âmbar contendo 20 mL, com gotejador atóxico + seringa dosadora.

Forma farmacêutica: Solução oral

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:

Bryonia alba	4CH	álc. 30%(v/v)	0,25 mL
Eupatorium perfoliatum	4CH	álc. 30%(v/v)	0,25 mL
Gelsemium sempervirens	5CH	álc. 30%(v/v)	0,25 mL
Rhus toxicodendron	6CH	álc. 30%(v/v)	0,25 mL

Veículo: álcool de cereais
Graduação alcoólica final: 30%

33 gotas equivalem a, aproximadamente, 1 mL do medicamento

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

LEPARIN® é indicado como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe.
A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

LEPARIN® tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas relacionados à gripe.

Os sintomas da gripe são caracterizados por febre, coriza, secreção catarral, tosse, calafrios, dores de cabeça, fraqueza, sonolência, boca e garganta secas, nariz vermelho e dolorido, e rouquidão.

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do LEPARIN®:

Bryonia alba: Age no combate à cefaleia (dor de cabeça), dores nas extremidades, constrição da garganta, dispneia (respiração com dificuldade) e febre.

Eupatorium perfoliatum: Age no combate à cefaleia (dor de cabeça), dores nos membros e nas costas, febre, rouquidão, tosse seca e irritante, coriza e calafrios.

Gelsemium sempervirens: Age no combate à fraqueza, sonolência, calafrios, febre, cefaleia, coriza e sensação de corpo estranho na garganta com dificuldade de deglutição.

Rhus toxicodendron: Age no combate à dores articulares, lábios secos, boca e garganta secas, garganta inchada, cefaleia, nariz vermelho e dolorido, tosse seca e rouquidão.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria "C").

O que significa risco de gravidez "categoria C"? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Até o momento, são desconhecidas outras contraindicações do medicamento **LEPARIN®.**

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite gotejar sob a língua, por produzir ardência causada pela presença de álcool.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 30%.

LEPARIN® possui, em sua formulação, insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo:

Incompatibilidade Rhus toxicodendron: Apis mellifica.

Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento LEPARIN®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 ºC), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: líquido, incolor e com odor alcoólico. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS

Como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe: Tomar 1 gota em 5 mL de água de hora em hora, espaçando o horário para intervalos de duas em duas horas, de três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Como preventivo: Tomar 1 gota em 5 mL de água de 12 em 12 horas, pelo período de 6 meses (outono e inverno), ou conforme orientação médica.

AO DILUIR A DOSE A SER ADMINISTRADA EM ÁGUA CONFORME POSOLOGIA SUGERIDA NESTA BULA, A GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DO MEDICAMENTO É

REDUZIDA A ZERO, O QUE PERMITE O USO SEGURO PARA A FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA.

CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS

Como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe: Tomar 5 gotas em 5 mL de água de hora em hora, espaçando o horário para intervalos de duas em duas horas, de três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Como preventivo: Tomar 5 gotas em 5 mL de água de 12 em 12 horas, pelo período de 6 meses (outono e inverno), ou conforme orientação médica.

ADULTOS

Como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe: Tomar 10 gotas em 5 mL de água de hora em hora, espaçando o horário para intervalos de duas em duas horas, de três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Como preventivo: Tomar 10 gotas em 5 mL de água de 12 em 12 horas, pelo período de 6 meses (outono e inverno), ou conforme orientação médica.

Faixa Etária	Quantidade de água para diluição	Quantidade do medicamento
Crianças até 2 anos	5 mL	1 gota
Crianças acima de 2 anos	5 mL	5 gotas
Adultos	5 mL	10 gotas

Instruções para o uso do medicamento nos pacientes pediátricos

Etapa 1: Utilizando a seringa dosadora, medir a quantidade de água indicada na posologia de acordo com a idade do paciente.	
Etapa 2: Dispensar a água medida na seringa dosadora em um recipiente (exemplo: xícara de café).	
Etapa 3: Adicionar ao recipiente a quantidade de gotas do medicamento indicada na posologia de acordo com a idade do paciente e aguardar de 1 a 2 minutos para evaporação do álcool.	
Etapa 4: Em seguida preencher a seringa dosadora com o medicamento já diluído em água e distribuir lentamente na boca do paciente, entre a bochecha e a gengiva. Não dispensar mais rápido do que o paciente é capaz de engolir confortavelmente.	
Etapa 5: Após a administração, lave a seringa com água e guarde-a na respectiva caixa para que possa ser utilizada novamente.	

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Quando utilizado como auxiliar no alívio dos sintomas relacionados à gripe, não desaparecendo os sintomas em até 7 (sete) dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento LEPARIN®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: sac@wplab.ind.br.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018.

Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus CRF - PR 16959

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

RECICLÁVEL

WP LAB
Indústria Farmacêutica
DESDE 1933

V07-BP